



Purina



Программа кормления кроликов Purina®

Обеспечивает сохранность и стабильный рост кроликов, высокую продуктивность кроликоматок.

Комбикорм для кроликов универсальный

(код 9206)

Описание

Сбалансированный универсальный корм для кроликов: крольчат после отъема, лактирующих и сукрольных кроликоматок

- Полностью обеспечивает потребность кроликов в витаминах, макро- и микроэлементах;
- Обеспечивает высокие производительные результаты — оптимальный рост и сохранность кроликов.

Результат

- **Кролики на откорме:** живая масса до 2,7 кг — к 90 дню выращивания по программе Purina® — при коэффициенте кормоконверсии 4;
- **Лактирующие и сукрольные кроликоматки:** до 50 крольчат на голову — в год при соблюдении программы Purina®.

Преимущества

- **При кормлении кроликоматок**
 - > Высокая молочность и сохранность крольчат;
 - > Высокие последующие темпы роста крольчат;
 - > Хорошая кондиция, быстрый приход в охоту;
 - > Высокое количество окролов и отнятых крольчат на кроликоматку в год (до 50).
- **При выращивании кроликов**
 - > Здоровый быстрый рост;
 - > Низкий расход корма и конверсия (до 4);
 - > Зрелое вкусное мясо и отсутствие лишнего жира;
 - > Профилактика кокцидиоза.

Схема кормления

	Период кормления	Потребление комбикорма
Лактующие матки и крольчата до отъема	0-35 день после окрота	Вволю
Сукрольные кроликоматки	отъем — окрол	200 г/гол/сутки
Кролики после отъема	36-70 день	80-155 г/гол/сутки
Кролики на откорме	от 71 дня до убоя	155-200 г/гол/сутки

Рекомендации при первом скармливании корма

Для начала кормления универсальным комбикормом Purina® рекомендуется переходный период: 5 дней с постепенным вводом корма по схеме:

1-й день: прежний корм и новый Purina® смешиваются в соотношении 80% и 20%;

2-й день: 60% и 40%;

3-й день: 50% и 50%;

4-й день: 40% и 60%;

5-й день: 20% и 80%.

Состав

Зерновые, шрот подсолнечный, мука травяная, отруби пшеничные, жом свекловичный, масло растительное, мука известняковая, фосфаты, аминокислоты, витамины, минералы, пробиотик, закрепитель гранулы, кокцидиостатик и другие ингредиенты.

Рекомендации по убою

За 5-7 дней до убоя постепенно перевести кроликов на корм без медикаментов для выведения из организма кокцидиостатика.

Срок хранения

6 месяцев с даты изготовления.



Рекомендации животноводам

- Не допускайте сквозняков и высокой влажности;
- Следите за доступностью и чистотой корма и воды.



Purina

ООО «Провими»
125167, Москва, Ленинградский пр., д.37,
корпус 9, подъезд 4
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru

Информация, содержащаяся в этой листовке, предоставляется исключительно в целях предварительного общего информирования покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данной листовкой не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся в листовке. Данные, мнения, оценки и иная информация в листовке могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более подробной информации о продукции, в том числе об условиях ее приобретения, пожалуйста, обращайтесь в магазины Purina® или к производителю.

© 2019 ООО «Провими». Исключительные права на используемые в настоящей листовке материалы, включая, но не ограничиваясь указанным, дизайн, порядок размещения материалов, изображения, принадлежат ООО «Провими». Любое использование, включая воспроизведение в печатных изданиях, распространение, копирование и иные действия в отношении указанных материалов без согласия ООО «Провими» считаются незаконными и влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Контакты магазина

